PHQ-2 — repérage de la dépression

ADOLESCENT + ADULTE · Évaluation actuelle · Au cours des deux dernières semaines

2 questions. Somme 0–6. Repère ≥3 : approfondir le repérage de la dépression. Deux symptômes sur les deux dernières semaines.

Indiquez la fréquence à laquelle chaque problème vous a gêné(e). La question finale de retentissement complète le profil et ne compte pas dans le total. Forme abrégée : répondre à chaque question. Les repères de la version longue ne sont pas transposés.

Date : _____ Initiales (facultatif) : _____

Choisissez une seule réponse par ligne.	Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié du temps	Presque tous les jours
1. Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses	○	○	○	○
2. Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)	○	○	○	○

Cotation et lecture du résultat

Somme 0–6. Repère ≥3 : approfondir le repérage de la dépression. Deux symptômes sur les deux dernières semaines.

Score / remarques : _____

Pour obtenir le calcul détaillé et réunir plusieurs échelles dans un dossier, passez les questionnaires gratuitement sur tousTDAH.fr/questionnaires.html.

PHQ-9 : Spitzer, Williams, Kroenke et collaborateurs, avec le soutien de Pfizer. Version French for France fournie.

Kroenke, Spitzer & Williams (2003). The Patient Health Questionnaire-2. Medical Care, 41, 1284–1292.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14583691/